

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful



Copyright disclaimer

"La faculté" is a website that collects medical documents written by Algerian assistant professors, professors or any other health practicals and teachers from the same field.

Some articles are subject to the author's copyrights.

Our team does not own copyrights for some content we publish.

"La faculté" team tries to get a permission to publish any content; however , we are not able to contact all authors.

If you are the author or copyrights owner of any kind of content on our website, please contact us on: facadm16@gmail.com to settle the situation.

All users must know that "La faculté" team cannot be responsible anyway of any violation of the authors' copyrights.

Any lucrative use without permission of the copyrights' owner may expose the user to legal follow-up.



A- Rappel :

1- Gène :

Facteur héréditaire, fragment d'ADN qui code ou une protéine de structure on l'appelle gène de structure, ou encore qui code une enzyme de régulation, on parle de gène régulateur

2- Locus :

Position du gène sur le chromosome

3- Allèles :

Se sont les différentes formes que peut prendre un gène

4- Homozygotes :

Les allèles sont identiques pour un même locus sur une paire de chromosomes homologues

5- Hétérozygotes :

Les allèles sont différents pour un même locus sur une paire de chromosomes homologues

6- Allèle dominant :

Allèle qui s'exprime à l'état homozygote et hétérozygote

7- Allèle récessif :

Allèle qui s'exprime qu'à l'état homozygote

Remarque :

En règle générale :

Un gène → porté sur un locus → donne un caractère → qui a deux formes appelés deux Allèles (un allèle dominant et un allèle récessif)

B- Etude du mon hybridisme et du di hybridisme gènes indépendants

1- Le mono hybridisme

Étude d'un caractère donné chez un individu

2- Le di hybridisme gène indépendant :

Etude de deux caractères, chaque caractère est porté une paire de chromosome

Deux caractères → deux paires de chromosomes homologues

3- Les lois de Mendel :

➤ 1ère loi de Mendel :

Loi de l'uniformité de la première génération : Tous les individus de la première génération (F1) issus du croisement de deux individus homozygotes (F0) ont le même phénotype.

➤ 2ème loi de Mendel :

Loi de la pureté des gamètes : Il n'y a qu'un seul exemplaire d'allèle pour un gène et par gamète

La seconde loi de Mendel s'applique à l'étude d'un caractère, c'est le croisement de deux individus hétérozygotes issus de F1, on obtient en F2 les proportions $\frac{3}{4}$ d'individu ayant le phénotype dominant et $\frac{1}{4}$ des individus ayant le phénotype récessif

➤ 3ème loi de Mendel :

Loi de la ségrégation indépendante des caractères

La loi de Mendel s'applique à l'étude de deux caractères portés sur deux paires de chromosomes différentes.

Si on considère deux caractères (A, a) et (B, b)

On croise deux individus purs (A/A, B/B) X (a/a, b/b)

On obtient en F1 100% hybride (A/a, B/b) le résultat est conforme avec la 1^{ère} loi de Mendel

Si on croise deux individus de F1, ces derniers produiront 4 type de gamètes, (A, B) (A,b) (a, B) et (a,b) avec une proportion de 25% chacun

Et 4 phénotypes F2 après croisement avec les proportions suivantes :

9/16 [AB], 3/16 [Ab], 3/16 [aB] et 1/16 [ab]

4- Back cross et test cross :

➤ Back cross:

Croisement d'un individu hétérozygote avec un individu homozygote, dans le but de purifier une ligné

➤ Test cross :

Croisement d'un individu de génotype inconnu avec un individu homozygote récessif, dans le but de déterminer le génotype

C- Etude des exceptions aux lois de Mendel :

1- Codominance :

Les deux Allèles sont dominant « on la même force d'expression » il s'exprime tout les deux en même temps

2- Absence de dominance :

Les deux Allèles sont récessif aucun ne s'exprime et cela traduit l'apparition d'un phénotype intermédiaire

3- Polyallélisme :

Le caractère possède plus de deux allèles

4- Polygénie :

Un caractère est contrôlé par plusieurs gènes

5- Pléiotropie :

Un gène contrôle plusieurs caractères « un effet primaire → donne plusieurs effets secondaire »

6- Létalité :

Le gène induit la mort de l'individu → létalité biologique

Le gène provoque la stérilité de l'individu → létalité génétique

7- Di hybridisme gènes liés :

On parle de gènes liés lorsqu'ils sont portés sur un même chromosome

Soient deux gènes (A,a) et (B,b) liés

Ces deux gènes sont séparés l'un de l'autre par une distance génétique qu'on nommera D. Cette valeur est donnée en centimorgan.

La distance génétique représente le pourcentage de recombinaison lors d'un croisement « 1% de recombinaison = 1 Centimorgan »

On peut calculer une distance physique entre deux gènes, on la donne en kilobase « 1KB = 1000 paires de base »

Remarque :

Les gènes peuvent être *liés en couplage* « position cis » : les dominants sont sur un chromosome et les récessifs sur l'autre chromosome homologue

Les gènes peuvent être *liés en répulsion* « position trans » : l'allèle dominant du 1^{er} caractère et l'allèle récessif du second caractère porté sur le 1^{er} chromosome, l'allèle récessif du 1^{er} caractère et l'allèle dominant du second caractère porté le second chromosome homologue du 1^{er}

➤ D=0 CM :

On parlera de Liaison Absolue ces deux gènes formeront que deux types de gamètes qui sont les gamètes parentaux

Si les gènes sont en position cis (lié en couplage) les gamètes parentaux sont (AB) et (ab)

Si les gènes sont en position trans (lié en répulsion) les gamètes parentaux sont (Ab) et (aB)

La fréquence des gamètes est 0.5 chacun

➤ 0 < D < 50 CM :

On parlera de liaison partielle, on obtient 4 types de gamètes deux gamètes parentaux et deux gamètes recombinant résultants du crossing over.

1^{er} cas : les gènes sont liés en couplage :

On obtient 4 types de gamètes,

(AB) et (ab) gamètes parentaux « F ytes (AB) = F ytes (ab) »

(Ab) et (aB) gamètes recombinant « F ytes (Ab) = F ytes (aB) »

Calcul de la fréquence des gamètes et de la Distance D :

Dans le cas du test Cross (AB/ab) X (ab/ab)

Gamètes	(AB) F=n	(Ab) F=n'	(aB) F= n'	(ab) F=n
(ab) F=1	[AB] F= n*1= n	[Ab] F= n'*1= n'	[aB] F= n'*1= n'	[ab] F= n*1= n

La fréquence des y tes = la fréquence des individus

D= fréquence des ytes recombinants X 100

D= F yte (Ab) + F ytes (aB)

Dans le cas de croisement de deux hétérozygotes (AB/ab) X (AB /ab)

Gamètes	(AB)	(Ab)	(aB)	(ab)
(AB)	[AB]	[AB]	[AB]	[AB]
(Ab)	[AB]	[Ab]	[AB]	[Ab]
(aB)	[AB]	[AB]	[aB]	[aB]
(ab)	[AB]	[Ab]	[aB]	[ab]

Noter que pour obtenir le phénotype [ab] il existe une seul possibilité de croisement

D'après le tableau :

Fréquence de l'individu [ab] = fréquence yte (ab) X fréquence yte (ab)

Fréquence de l'individu $[ab] = [F \text{ yte } (ab)]^2 \rightarrow F \text{ yte } (ab) = \sqrt{F [ab]}$

$F[ab] = \text{nb d'individu } [ab] / \text{nb d'individu Total}$

$$F \text{ yte } (ab) = \sqrt{\text{nb d'individu } [ab] / \text{nb d'individu Total}}$$

Calcul de la fréquence des autres gamètes :

$$F \text{ yte } (AB) = F \text{ yte } (ab)$$

$$F \text{ yte } (AB) + F \text{ yte } (aB) + F \text{ yte } (Ab) + F \text{ yte } (ab) = 1$$

$$2 [F \text{ yte } (ab)] + F \text{ yte } (Ab) + F \text{ yte } (aB) = 1$$

$$F \text{ yte } (aB) + F \text{ yte } (Ab) = 1 - 2 [F \text{ yte } (ab)]$$

$$F \text{ yte } (aB) = F \text{ yte } (Ab)$$

$$F \text{ yte } (aB) = F \text{ yte } (Ab) = (1 - 2 [F \text{ yte } (ab)]) / 2$$

Calcul de la distance:

$D = \text{fréquence des y tes Recombinants} \times 100 \text{ CM}$

$$D = [F \text{ yte } (Ab) + F \text{ yte } (aB)] \times 100$$

$$D = (1 - 2 [F \text{ yte } (ab)]) \times 100 \text{ Cm}$$

2^{ème} cas : les gènes sont liés en répulsion :

On obtient 4 types de gamètes,

(Ab) et (aB) gamètes parentaux « $F \text{ ytes } (Ab) = F \text{ ytes } (aB)$ »

(AB) et (ab) gamètes recombinant « $F \text{ ytes } (AB) = F \text{ ytes } (ab)$ »

Calcul de la fréquence des gamètes et de la Distance D :

Dans le cas du test Cross $(Ab/aB) \times (ab/ab)$

Gamètes	$(AB) F=n$	$(Ab) F=n'$	$(aB) F=n'$	$(ab) F=n$
$(ab) F=1$	$[AB] F=n*1=n$	$[Ab] F=n'*1=n$	$[aB] F=n'*1=n$	$[ab] F=n*1=n$

La fréquence des y tes = la fréquence des individus

*D= fréquence des ytes recombinants *100*

D= F yte (AB) + F ytes (ab)

Dans le cas de croisement de deux hétérozygotes (Ab/aB) X (Ab /aB)

Gamètes	(AB)	(Ab)	(aB)	(ab)
(AB)	[AB]	[AB]	[AB]	[AB]
(Ab)	[AB]	[Ab]	[AB]	[Ab]
(aB)	[AB]	[AB]	[aB]	[aB]
(ab)	[AB]	[Ab]	[aB]	[ab]

$$F \text{ yte } (ab) = \frac{\text{nb d'individu } [ab] / \text{nb d'individu Total}}$$

Calcul des autres gamètes :

$$F \text{ yte } (AB) = F \text{ yte } (ab)$$

$$F \text{ yte } (AB) + F \text{ yte } (aB) + F \text{ yte } (Ab) + F \text{ yte } (aB) = 1$$

$$F \text{ yte } (aB) + F \text{ yte } (Ab) = 1 - 2 [F \text{ yte } (ab)]$$

$$F \text{ yte } (aB) = F \text{ yte } (Ab)$$

$$F \text{ yte } (aB) = F \text{ yte } (Ab) = (1 - 2 [F \text{ yte } (ab)]) / 2$$

Calcul de la distance:

$$D = \text{fréquence des y tes Recombinants} \times 100 \text{ CM}$$

$$D = [F \text{ yte } (AB) + F \text{ yte } (ab)] \times 100$$

$$D = 2 [F \text{ yte } (ab)] \times 100 \text{ Cm}$$

➤ D>50CM :

Liaison en **Synténie** 1, les gènes se comportent comme deux gènes indépendants on obtient 4 types de gamètes avec une proportion de **0.25 chacun**.

8- Hérité lié au sexe :

Etude de l'expression et de la transmission des gènes qui sont portés sur les chromosomes **X** et **Y**

➤ Chromosome Y :

Il est plus petit que le chromosome X Porte une 100ème de gènes non vitaux, on nomme ces gènes, *Gène Holandrique*.

Il porte les gènes du déterminisme sexuel

Sur le locus TDF « testis determining factor » se trouvent deux gènes, SRY, sexe determining region of Y, et ZFY Zinc Finger Protéine, ils agissent sur les cellules de Leydig qui produisent la testostérone

- La testostérone oriente la différenciation de la gonade primaire en testicules
- La testostérone stimule la spermatogenèse
- La testostérone est responsable de l'apparition des caractères sexuels secondaires

Remarque :

Une mutation des gènes du déterminisme du sexe ou de la spermatogenèse entraîne une infertilité ou encore une anomalie génitale

Mode de transmission des gènes holandriques

La transmission des gènes holandriques se fait du père vers ces garçons seulement.

➤ Chromosome X :

Porte des gènes vitaux,

Chez la femme il existe deux chromosomes X alors que chez l'homme il n'en existe qu'un seul, → deux fois plus de gène X chez la femme que chez l'homme

Pour éviter une surcharge génique un des deux chromosomes X chez la femme est inactivé, On appelle ce phénomène : **phénomène de lyonisation**

Ce phénomène se fait à un stade précoce du développement embryonnaire «16 jours »

Le chromosome X inactivé donne un corpuscule de Barr

Chez la femme ses deux chromosomes X lui viennent de son père et de sa mère ; elle a donc un chromosome X d'origine paternel « Xp » et un chromosome X d'origine maternel « Xm »

Le chromosome X qui subit le phénomène de lyonisation est sélectionné au hasard

On a donc chez la femme :

50% de chromosome Xp actif et 50% de chromosome Xm actif.

50% de corpuscule de Barr d'origine paternel inactif et 50% de corpuscule de Barr d'origine maternel inactif.

C'est pour cela qu'on dit que la femme est mosaïque

Remarque :

Le corpuscule de Barr est inactif qu'à 75 %, 25 % de ce corpuscule de Barr reste actif. Ces 25 % représentent la région pseudo-autosomique du chromosome X.

La région pseudo –autosomique est un ensemble de gènes commun entre les chromosomes X et Y.

Mécanisme de lyonisation :

Inactivation se fait par condensation du chromosome X sélectionné

Il existe un centre d'inactivation du gène sur le chromosome X c'est le Xic, C'est le point de commande de l'inactivation du X

Le Xic active un gène spécifique du chromosome X appelé Xist qui produit un ARN non traduit

Cet ARN tapissera le long du chromosome induisant ainsi sa compactation et son inactivation (les gènes de ce chromosome ne seront plus transcrits)

Phénomènes de lyonisation défavorable et de lyonisation favorable :

Il arrive qu'il ait un déséquilibre entre la proportion de corpuscule de Barr d'origine maternel et ceux d'origine paternelle, on est alors dans les cas de lyonisation défavorable ou favorable.

Lyonisation défavorable :

Le déséquilibre permet à un allèle porté sur X récessif de s'exprimer chez la femme.

Lyonisation favorable :

Le déséquilibre permet à un allèle porté sur X dominant de ne pas s'exprimer chez la femme

Mode de transmission des gènes porté sur X :

Les gènes portés sur X de l'homme :

Allèle dominant porté sur le X de l'homme

Il transmet l'allèle à toutes ces filles, et elles exprimeront toutes le caractère « dominant »

Il ne le transmet à aucun de ces garçons

Allèle récessif porté sur le X du père :

Il transmet l'allèle à toute ces filles, elles exprimeront le caractère sauf si elles reçoivent le même Allèle récessif de la mère

Si elles ne reçoivent pas l'Allèle récessif de la mère on dira qu'elles sont conductrices.

Il ne le transmet jamais au garçon

Les gènes portés sur le X de la femme :

Allèle dominant porté sur le X de la femme :

Elle transmet l'allèle dominant à toutes ces filles et à tous ces garçons, les filles comme les garçons exprimeront le caractère « dominant »

Allèle récessif porté le X de la femme :

Elle transmet l'Allèle récessif à toutes ces filles, elles exprimeront le caractère sauf si elles reçoivent le même Allèle récessif du père

Si elles ne reçoivent pas l'Allèle récessif du père on dira qu'elles sont conductrices

Elle transmet l'Allèle à tous ces garçons qui exprimeront le caractère récessif

9- Hérité influencé par le sexe :

On parle de caractère influencé par le sexe lorsque son mode d'expression change d'un sexe à l'autre « dominant chez un sexe et récessif chez l'autre »

10- Hérité limité à un sexe :

Un caractère limité à un sexe est un caractère qui s'exprime que chez un sexe et jamais chez l'autre +3

Résumé des Maladies et caractères étudiés en cours

Maladie/ caractère	Symptômes	Dominance et récessivité	Autosomique ou gonosomique
Dentinogenesis imperfecta	Dents brunâtres et gencive dégénérée	Dominante, létale à l'état homozygote (prénatal)	Autosomique
Brachydactilie	Doigts et orteils court	Dominante, létale à l'état homozygote (prénatal)	Autosomique
Progeria	Vieillessement précoce	Dominante, létale à l'état homo zygote et hétérozygote (post natal 12 ans)	Autosomique
Albinisme	Dépigmentation de la peau et des phanères	Récessif	Autosomique
Syndrome de Marfan	Touche les tissus conjonctifs	Dominante	Autosomique
Anémie falciforme	Globule rouge sous forme de lune	Récessif	Autosomique
Hypertrichose des oreilles	Des poils dans les oreilles	Ne s'exprime que chez les hommes	Holandrique « porté sur Y »
Porc épic	Poils en épines et peau en écorce	Ne s'exprime que chez les hommes	Holandrique « porté sur Y »
Daltonisme	Mauvaise perception des couleurs	Récessif	Gonosomique porté sur X
Myopathie de Duchenne	Dégénérescence des fibres musculaires	Récessif	Gonosomique porté sur X
Hémophilie	Mauvaise coagulation du sang « hémorragie »	Récessif létale à l'état homozygote	Gonosomique porté sur X
Rachitisme vitamino-dépendant	Mauvaise calcification des os et des cartilages	Dominante	Gonosomique porté sur X